

Grandes Cultures

DLP 16-10-95 030524

Champagne-Ardenne

Bulletin n°297 du 11/10/95 : 2 pages

d'après les observations des 9 et 10/10/95

AVERTISSEMENTS AGRICOLES


Imprimerie du SRPV Champagne-Ardenne - Le Directeur-Gérant : D. PINÇONNET - CFPPAP n° 529 AD (© SPV 1989) - ISSN 0295-5776

COLZA

Stade 4 à 7-8 feuilles.

Charançon du bourgeon terminal

Le vol se poursuit dans l'Aube et l'Argonne. Les premières captures ont été enregistrées le week-end dernier dans la plupart des autres secteurs (Perthois, Tardenois, Brie, ...). Seules les Ardennes sont encore épargnées pour l'instant.



CE CHARANÇON SE RECONNAIT A SA TACHE BLANCHE SUR LE DOS

■ ***Nos conseils : un traitement devra être réalisé 8 à 10 jours après les premières captures, même si le niveau des captures est faible. Ces interventions devraient être déclenchées cette semaine dans l'Aube et l'Argonne, vers le 15/10 dans la Marne et vraisemblablement vers le 20-25/10 dans les Ardennes.***

Pucerons

A de très rares exceptions près, les populations de pucerons restent faibles. Mais le temps chaud et ensoleillé actuel leur est favorable. Les analyses réalisées par notre Service sur pucerons révèlent l'absence de virus.

Fréquence de pieds porteurs le 10 /10

Lieu	%
08 Rethel	8
St Fergeux	0
Tagnon	20
51 Sompuis	0
Changy	0
Crugny	0
Vauchamps	0
10 Ville/Arce	0
Rumilly les Vaudes	0
Mesnil Vallon	2
Savières	0

■ ***Nos conseils : visitez régulièrement vos parcelles. Le seuil d'intervention est de l'ordre de 20% de pieds porteurs. Le même traitement peut couvrir le risque charançon et le risque pucerons.***

Autres insectes

Les tenthrèdes de la rave, les baris et les limaces sont toujours là !


■ ***Nos conseils : continuer à surveiller les limaces.***

CEREALES

Les parcelles les plus précoces sont au stade 1-2 feuilles

Pucerons

Les captures du pucerons à la tour de Lavannes se sont légèrement intensifiées ce week-end (20 captures).



Sur repousses de céréales, les populations de pucerons restent le plus souvent faibles (de 0 à 10 % de pieds porteurs). Dans les parcelles levées, les tout premiers pucerons sont arrivés. Les populations restent très faibles mais pourraient s'accroître avec la persistance des conditions météo actuelles.

Le % de pucerons virulifères est toujours bas, mais peu significatif vu la faible proportion de plantes colonisées.

Pots infestés par le virus

Semaine d'exposition	1994	1995
11 au 17/09	0 %	**0 %**
18 au 24/09	0 %	**1 %**
25/09 au 1/10	3 %	**0 %**

■ ***Nos conseils : il est encore trop tôt pour réaliser une éventuelle intervention .***

Cicadelles sur blé

Avec la remontée des températures, l'activité des adultes de Psammotettix s'est intensifiée. Attention, car 75% des cicadelles piégées n'appartiennent pas à des espèces vectrices.

Captures du 25/09 au 1/10

Lieu	Nombre
Laine aux Bois (blé)	33
Laine aux Bois (orge)	8
Avalleur (blé)	15
Arrentières (friche)	47

■ ***Nos conseils : dans l'Aube, protéger rapidement les parcelles de blé, au stade 1 feuille, non traitées GAUCHO et situées sur les plateaux.***



Colza : traiter les charançons dans l'Aube. Toujours peu de pucerons.

Céréales : lers pucerons dans les parcelles levées. Attention aux cicadelles dans l'Aube.

P41

Service Régional de la Protection des Végétaux
62 Avenue Nationale - La Neuvillette
BP 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Tel : 26.09.06.43 Fax : 26.87.14.64 ou 26.87.39.33

Jaunisse des céréales

Surveiller les pucerons ailés

Lors des analyses virologiques, ce sont tout d'abord les **jeunes orges** semées en pots qui sont analysées puis les pucerons ailés capturés à la tour ou sur les pots piège qui sont testés. Pour l'instant, les réponses positives sont très faibles.

Cela est très différent lorsque l'on fait les analyses sur **repousses**. Celles-ci sont dans la plupart des cas porteuses de virus, ce qui est normal compte-tenu de la campagne dernière. En effet, beaucoup de céréales étaient virosées et donc les pucerons (aptères principalement) sont également virulifères. L'inoculum est effectivement présent et le risque existe. Il est cependant difficile d'estimer la gravité du risque à partir de ces seules analyses.


Ce ne sont pas les pucerons aptères des repousses qui iront coloniser les jeunes céréales mais bien les ailés qui auront pu se charger en virus dans ces repousses. Aussi, tant que le vol d'ailés reste faible, le risque reste limité.

Agriculteurs Techniciens

retenez cette date

Le SRPV Champagne Ardenne et la FDGPC de la Marne

vous invitent à une réunion technique



Venez dialoguer avec nous sur les thèmes suivants :

Les viroses en grandes cultures

Les Avertissements Agricoles

Le mildiou de la vigne

La politique de la France en matière d'environnement

avec la participation de Michel LARGUIER, du Bureau Protection des cultures et Environnement de la Sous Direction de la Protection des Végétaux de PARIS.